

Verliest u urine tijdens  
normale, dagelijkse  
activiteiten?

**Gebeurt  
dit als u:**



Lacht? Hoest? Niest?  
Aan lichaamsbeweging doet?

Patiëntenbrochure voor  
urine-incontinentie en de  
Solace Ballon studie

## Over Stress-Incontinentie

---

Bijna 1 op de 4<sup>1</sup> vrouwen van 18 jaar en ouder heeft last van onverwacht urineverlies, ook wel bekend als stress-incontinentie (SI). Dit kan gebeuren tijdens normale dagelijkse activiteiten zoals:

Lachen    Hoesten    Niezen    Lichaamsbeweging

SI kan de levenskwaliteit van vrouwen enorm verminderen en beperkt hen vaak in hun beroeps-, sociale, seksuele en recreatieve activiteiten.

SI treedt op als de druk in de buik tijdens de lichamelijke activiteit op de blaas 'duwt', waardoor er urine verloren wordt. Zoals u op de illustratie hieronder ziet, leidt deze plotselinge drukverhoging in de blaas tot urineverlies.



## Huidige Behandel mogelijkheden

---

De patiënttevredenheid over de huidige behandel mogelijkheden is beperkt. In studies bij patiënten hebben vrouwen hun voorkeur voor een niet-operatieve behandeling uitgesproken<sup>2</sup>.

Bij sommige vrouwen kunnen oefeningen om de spieren te trainen (methode van Kegel, biofeedback, enz.) helpen de controle over de blaas tijdens drukmomenten te verbeteren.

De vrouwen bij wie deze behandeling helpt, moeten echter wel regelmatig oefeningen blijven doen voor een blijvend resultaat.

Voor de behandeling van SI bestaan ook verschillende operatieve ingrepen. De slingprocedure is de operatie die het vaakst uitgevoerd wordt. Hierbij wordt de blaashals operatief opgetild om de ondersteuning te verbeteren. Hoewel een operatie voor SI voor sommige vrouwen effectief kan zijn, helpen deze operaties slechts gedurende een beperkte periode en vereisen ze algehele narcose en lange herstelperiodes.

## Over De Solace-Ballon Procedure

De Solace-ballonprocedure is een nieuwe, niet-operatieve behandeling voor onverwacht urineverlies en wordt momenteel geëvalueerd in verschillende klinische studiecentra in Europa.

De Solace-ballon is een kleine, zachte, met lucht gevulde ballon die in de blaas drijft. De Solace-ballon werkt als een drukdemper om de druk in de blaas tijdens lichamelijke activiteit te verminderen.



# Over De Solace-Ballon Procedure

## Solace Ballon Plaatsing:

- De Solace-ballon wordt ingebracht via de natuurlijke opening van de blaas, ook wel de urinebuis, plasbuis of urethra genoemd. Het inbrengen duurt ongeveer 10 minuten en wordt uitgevoerd in het centrum of het ziekenhuis waar de dokter werkt.
- Er is geen verdoving nodig.
- U kunt uw normale dagelijkse activiteiten meteen na de procedure hervatten.
- Er zijn geen regels of beperkingen voor uw levensstijl na de Solace-ballonprocedure.

## Solace Ballon Verwijdering:


- De Solace-ballon wordt onder directe visualisatie via een beschermbuisje verwijderd met een tangetje. Door hetzelfde beschermbuisje wordt een nieuwe Solace-ballon ingebracht.
- Nadat de Solace-ballon is vervangen, kunt u uw normale dagelijkse activiteiten hervatten.



Een niet-opgeblazen Solace-ballon wordt in de blaas gebracht via een beschermhuisje.



De Solace ballon wordt opgeblazen, vrijgegeven, en de beschermende buis wordt verwijderd.



Door een beschermhuisje wordt een tangetje in de blaas gebracht dat de ballon vastpakt.



Het tangetje laat de Solace-ballon leeglopen. Het tangetje, de lege Solace-ballon en het beschermhuisje worden verwijderd.

## Over De Solace-Studie

---

Binnenkort wordt er in Europa een klinische studie naar de Solace-ballonprocedure opgestart. De Solace-ballon is een nieuw, niet-operatief behandelingsalternatief voor onverwacht urineverlies. De Solace-ballon is vrijgegeven voor verkoop in Europa, en het doel van deze studie is het verzamelen van aanvullende informatie over de Solace-ballonprocedure.

Als u in aanmerking komt voor en wilt deelnemen aan de Solace-studie, wordt u behandeld door een ervaren blaasspecialist en krijgt u alle zorg in verband met de studie gratis. De zorg bestaat uit de Solace-ballonprocedure en alle onderzoeken en bezoeken voor de Solace-studie. Als u deelneemt aan de Solace-studie komt u ongeveer elf (11) keer naar de dokter in een periode van zesendertig (36) maanden, om informatie te geven over uw ervaringen.

Voor meer informatie over de Solace studie, neem dan contact op met de studie site of kijk op: [www.bladdercomfort.com](http://www.bladdercomfort.com).



## Basiscriteria Om In Aanmerking Te Komen Voor de Studie:

---

- Vrouw van 18 jaar of ouder
- Voorgeschiedenis van urineverlies (SI) van ten minste 12 maanden
- Niet-operatieve behandeling zonder succes (een van de volgende: gedragsverandering, oefeningen om de blaas te trainen, revalidatie van de bekkenbodemspieren, biofeedback, elektrostimulatie of behandeling met medicijnen)
- Beschikbaar voor 11 bezoeken over een periode van 36 maanden

Als u geschikt bent voor en deelneemt aan de Solace-studie, krijgt u alle zorg in verband met de studie gratis. De zorg bestaat uit de Solace-ballonprocedure en alle onderzoeken en bezoeken voor de Solace-studie.



*Voor meer informatie,  
bezoek [www.bladdercomfort.com](http://www.bladdercomfort.com)*



**Privacy:**

De studieartsen en hun personeel respecteren uw privacy. Gegevens over uw incontinentiesymptomen worden niet doorgegeven aan personen die niet direct te maken hebben met de onderzoeksstudie. Uw studiearts zal u nog meer informatie geven over hoe er met de gegevens over uw persoonlijke gezondheid wordt omgegaan.

**Referenties:**

<sup>1</sup>Urinary incontinence as a worldwide problem-*International Journal of Gynecology & Obstetrics* Jaargang 82, uitgave 3, pp. 327-338, september 2003

<sup>2</sup>Robinson D, Anders K, Cardoza L, et al. "What Women Want – their interpretation of the concept of cure." Samenvatting gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ICS in augustus 2002.